

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。

改善激躁性腸道症候群（IBS）復發症狀藥劑

第 2 類醫藥品

# CEREKINON®S

- CEREKINON S 是以消化道運動調節劑馬來酸曲美布丁片作為有效成份、改善激躁性腸道症候群（IBS）症狀的藥劑。
- IBS 是因為壓力等因素造成腸過敏、腸道運動功能發生異常而引發症狀並惡化。
- 馬來酸曲美布丁片有著讓腸道運動回復正常的效果。因此不論是對腹瀉型、便秘型、混合型的 IBS 都能發揮效果。

## ⚠ 使用注意事項



### 禁止事項

（違反時可能導致症狀加重或容易出現副作用）

1. 下列情況者請勿服用。
  - (1) 過去沒有被醫生診斷出激躁性腸道症候群或受過治療者。
  - (2) 不確定是否激躁性腸道症候群復發者（例如，此次症狀與過去被診斷及治療的激躁性腸道症候群不同）。
  - (3) 即使是夜晚在睡眠中，也會為了排便而起來上廁所、腹痛者。
  - (4) 有發燒情況者。
  - (5) 有關節疼痛情況者。
  - (6) 糞便黏稠帶血（血便）者。
  - (7) 不斷嚴重腹瀉者。
  - (8) 急性嚴重腹瀉者。
  - (9) 排便伴隨不明腹痛者。
  - (10) 有嘔吐情況者。
  - (11) 6 個月之內在非預期的情況下體重減少 3 公斤以上者。
  - (12) 有大腸癌、發炎性腸道疾病（克羅恩病、潰瘍性大腸炎等）之病史者。
  - (13) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀者。
  - (14) 未滿 15 歲的兒童。

2. 請勿長期服用。



### 慎用事項

1. 下列情況者於使用前請先向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。
  - (1) 正在接受醫師治療者。
  - (2) 孕婦或可能懷孕者。
  - (3) 正在哺乳者。
  - (4) 50 歲以上者。
  - (5) 有貧血情況者。
  - (6) 曾因藥品等，引發過敏症狀者。
  - (7) 曾被診斷過下列疾病者：肝病、糖尿病、甲狀腺機能異常、副甲狀腺機能亢進
  - (8) 家人中有人罹患大腸癌、發炎性腸道疾病。
  - (9) 嚴重腹痛、便秘者。
2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發癢、蕁麻疹
消化器官	便秘、腹瀉、腹鳴、口渴、口內麻木感、噁心、嘔吐
精神神經系統	嗜睡、暈眩、倦怠感、頭痛
其他	心悸、排尿困難、尿道閉塞

（持續至背面）

(接續前面內容)

罕見的情況下會發生下列嚴重症狀。請立即接受醫師治療。

症狀的名稱	症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等情況。

3. 服用 1 週後也未見成效又或是即使症狀獲得改善，在服用超過 2 週時，請攜帶此文件向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。但服用超過 2 週時最長請不要超過 4 週。

## 效能

舒緩激躁性腸道症候群的以下症狀：腹痛或腹部伴隨不適感，不斷的或是交互的出現腹瀉、便秘。（僅限於過去曾被醫生診斷及治療者。）

## 用法用量


下述的份量於飯前或飯後以水或溫水服用。

年齡	1 次劑量	1 日服用次數
成人（15 歲以上）	1 片	3 次
未滿 15 歲	請勿服用	

<用法用量相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法用量。
- (2) 錠劑的取出方法

如右圖用手指用力壓 PTP 鋁箔裝著藥的凸處，擠破背面的鋁箔紙後，取出服用。  
（如誤將藥劑與包裝一起服下，會導致刺傷食道黏膜等意外事故。）



## 成份（1 日用量：3 片中）

馬來酸曲美布丁片 · · · 300mg

添加物：乙基纖維素、羥甲基纖維素鈣、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙甲纖維素、聚乙二醇

## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於不會直射日光、濕度較低之涼爽場所。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝至其他容器中。（可能會造成誤食或變質。）
- (4) 請不要使用過期的製品。



生產販賣商  
田邊三菱製藥株式会社  
大阪市中央區道修町 3-2-10

網頁 [www.mt-pharma.co.jp](http://www.mt-pharma.co.jp)