

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。

肠易激综合征（IBS）的复发病状改善药

第2类医药品

舒丽启能®S

- 舒丽启能 S 是一种以胃肠道运动调律剂马来酸曲美布汀作为活性成分，旨在改善肠易激综合征（IBS）症状的药物。
- IBS 会因压力等导致肠道过敏，并因肠道运动功能异常而发病和恶化。
- 马来酸曲美布汀具有使肠运动正常化的作用。因此，其对腹泻型、便秘型以及混合型等任何类型的 IBS 均有效。

⚠ 使用注意事项



禁止事项

（违反时则症状加重或易出现副作用）

1. 下列患者请禁用。

- (1) 未曾被医生诊断为肠易激综合征或未接受过相关治疗的患者。
- (2) 不清楚肠易激综合征是否有复发的患者（例如，本次的症状与之前接受肠易激综合征的诊断、治疗时不同）。
- (3) 在夜间睡觉时也会想要去洗手间排便，或腹痛的患者。
- (4) 有发热症状的患者。
- (5) 关节疼痛的患者。
- (6) 有粪便带血（血便）的患者。
- (7) 反复严重腹泻的患者。
- (8) 急性严重腹泻的患者。
- (9) 腹痛不因排便而改善的患者。
- (10) 有呕吐症状的患者。
- (11) 在 6 个月内意外减重超过 3kg 的患者。
- (12) 有结肠癌、炎症性肠病（克隆氏病、溃疡性大肠炎等）的既往病史的患者。
- (13) 对本品或本品成分有过敏史的患者。
- (14) 未满 15 岁的儿童。

2. 请不要长期连续使用。



慎用事项

1. 下列患者请向医生、药剂师或登录贩卖者咨询后使用。

- (1) 正在接受医生治疗的患者。
- (2) 孕妇或有可能怀孕的患者。
- (3) 哺乳期的患者。
- (4) 50 岁以上的患者。
- (5) 贫血的患者。
- (6) 有药物等过敏史的患者。
- (7) 诊断为以下疾病的患者：肝病、糖尿病、甲状腺功能障碍、甲状旁腺功能亢进症
- (8) 有家患者患有结直肠癌和炎症性肠病的患者。
- (9) 胃痛、便秘严重的患者。

2. 服用后出现下列症状时，有可能是副作用，请立即停止服用，并持此说明书向医生、药剂师或登录贩卖者咨询。

| 相关部位 | 症状 |
|--------|--------------------------|
| 皮肤 | 发疹、瘙痒、荨麻疹 |
| 消化系统 | 便秘、腹泻、腹胀、口腔干燥、口腔麻木、恶心、呕吐 |
| 精神神经系统 | 嗜睡、头晕、倦怠感、头痛 |
| 其他 | 心悸、排尿困难、尿滞留 |

<上接正面>

极少数情况下有可能出现以下严重症状。此时请立即接受医生治疗。

| 症状名称 | 症状 |
|-------|--|
| 肝功能障碍 | 出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。 |

3. 如果服用一周后症状仍无好转或者虽然症状有所好转，但服用期间超过两周时，请持本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。另外，如需超过两周服用，最多请勿超过4周。

功能

用于缓解肠易激综合征的以下各症状：伴有腹痛或腹部不适的，反复或交替出现的腹泻和便秘（仅限于曾接受过医生诊断、治疗的患者。）

用法与用量


请在饭前或饭后用水或热水送服以下剂量。

| 年龄 | 单次用量 | 1日服用次数 |
|-----------|------|--------|
| 成人（15岁以上） | 1片 | 3次 |
| 未满15岁 | 请勿服用 | |

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格按用法用量使用。
(2) 片剂的取出方法

如右图，请用手指用力按压装有片剂的PTP包装板的凸面，则反面的铝箔包装会被压破开，即可取出药片服用。（如不慎连同包装一同误服的话，有可能造成刺伤食道粘膜等不可想象的严重后果。）



成分（单日剂量：3片中）

马来酸曲美布汀···300mg

辅料：乙基纤维素、羧甲基纤维素钙、硬脂酸镁、纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇

保管及使用的注意事项

- (1) 请避免阳光直射，阴凉干燥处密封保存。
(2) 请在儿童接触不到的地方保存。
(3) 请不要更换容器。（容易导致误用和变质。）
(4) 请不要服用过期的产品。



制造销售商
田边三菱制药株式会社
大阪市中央区道修町 3-2-10

主页 www.mt-pharma.co.jp