

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。

CORTf® MD 軟膏

第 2 类医药品 湿疹、皮炎治疗药。 合成副肾上腺皮质激素・外用软膏

湿疹、皮炎是因异物刺激和过敏反应等引起的皮肤炎症，多数情况下，患部会变得红肿、起疹和伴有瘙痒。CORTf® MD 软膏的主要成分泼尼松龙（合成肾上腺皮质激素）与甘草次酸（抗炎成分）温和起效，抑制湿疹、皮炎等的炎症。是一种不含香料、着色剂和防腐剂的软膏类外用制剂，可用于婴儿这种药物容易渗透且较薄的皮肤。

⚠ 使用注意事项

⊗ 禁止事项

（违反时则症状加重或易出现副作用）

1. 下列部位请禁用
水痘、脚气、癣等的部位或化脓的患处。
2. 请不要在颜面部大面积使用。
3. 请不要长期连续使用。



⚠ 慎用事项

1. 下列患者请向医生、药剂师或持有销售许可证者咨询后使用。
 - (1) 正在接受医生治疗的患者。
 - (2) 孕妇或有可能怀孕的患者。
 - (3) 有药物过敏史的患者。
 - (4) 患处面积大的患者。
 - (5) 浸润、溃烂严重的患者。
2. 使用后出现下列症状时，有可能是副作用，请立即停药，并持此说明书向医生、药剂师或持有销售许可证者咨询。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒、红肿、斑疹、干燥感、刺激感、热感、刺痛感
皮肤(患处)	脚气、癣等的白癣、粉刺、化脓、持续刺激感

3. 用药 5~6 日后症状未见好转时，请停药，并持此说明书向医生、药师或持有销售许可证者咨询。

功用 适用于湿疹、皮炎、斑疹、瘙痒、蚊虫叮咬、疖子、荨麻疹、冻疮。

用法用量 1日 1~4 次，请适量涂于患部。

<用法用量相关的注意事项>

- (1) 请严格按用法用量使用。
- (2) 用于儿童时，请在监护人的指导下使用。
- (3) 请注意不要弄入眼睛。如果不慎弄入眼内，请立即用自来水或温水冲洗。
严重时请去眼科就诊。
- (4) 本品仅供外用。

成分（1g 中）

成分	含量	功能
泼尼松龙（合成肾上腺皮质激素）	2.5mg	抑制皮肤的炎症、红肿
甘草次酸	5mg	抑制皮肤的炎症、红肿

辅料：山梨醇硬脂酸酯、硬脂酸、肉豆蔻酸异丙酯、角鲨烷、石蜡、凡士林

保管及使用的注意事项

- (1) 请避免日光直射，阴凉干燥处密封保存。
- (2) 请在儿童接触不到的场所保存。
- (3) 请不要更换容器。（容易导致误用和变质）
- (4) 请不要使用过期的制品。



销售商
田边三菱制药株式会社
大阪市中央区道修町 3-2-10

网址 www.mt-pharma.co.jp



生产销售商
Teika 制药株式会社
富山市荒川一丁目 3 番 27 号

CORTf® MD 软膏

第2类医药品 湿疹、皮炎治疗药。 合成副肾上腺皮质激素·外用软膏

准确理解， 正确治疗。

湿疹、皮炎等皮肤疾患，通常表现为炎症引起的皮肤红、肿、痒等症状。瘙痒严重时，常常因难以忍受而不由自主地抓挠。抓挠本身又会形成刺激，使炎症加重、瘙痒加剧，从而陷入一个恶性循环。因此发现皮肤疾患后，迅速采取有效的治疗措施是非常重要的。




皮肤上
看F的
力量

配合具有极好抗炎症作用的外用甾体·肤轻松

治疗湿疹、皮炎时，重点在于选择适合不同年龄层皮肤的屏障功能并充分发挥疗效的药剂。由于角质层未成熟，皮脂分泌较少的婴儿的皮肤屏障功能较弱，药物比较容易渗透，因此即使是作用温和的外用甾体也能发挥充分的抗炎作用。

CORTf®MD 软膏配有药效温和的外用甾体-泼尼松龙，并且未添加任何香料、着色剂和防腐剂，因此适用于婴儿的娇嫩肌肤。

※CORTf 系列中包括因活性成分不同、发挥不同抗炎作用的产品。



关于甾体外用剂（合成副肾上腺皮质激素复合外用剂）

何谓甾体外用剂？

副肾上腺皮质激素是体内激素的一种，具有抑制炎症的作用。化学结构经优化、抗作用经强化后的副肾上腺皮质激素视为合成副肾上腺皮质激素。用于外皮的合成副肾上腺皮质激素，称为外用甾体，作成外用制剂后，称其为甾体外用剂。甾体外用剂不仅能抑制红、肿、痒等症状，还有抑制炎症发生的作用。

关于药效的强度

配有外用甾体的 CORTf 系列包含 3 种活性成分不同，发挥不同抗炎作用的产品。CORTfMD 软膏配有的外用甾体-泼尼松龙的药效属于强度较弱的类型。

弱 <---> 强

关于副作用

合成副肾上腺皮质激素作为内服药被用于多种炎症，但其有抑制肾上腺机能等全身性的副作用。因此，开发了对全身影响比较小的甾体外用剂。作为甾体外用剂，其副作用主要是长期使用后有皮肤变薄、皮肤血管扩张的现象。另外，用于因脚气等引起的感染部位时，可能会使症状恶化。使用前请仔细阅读背面的使用注意事项，并正确地使用。

为正确认识和治疗皮肤疾患，本公司开设了题为「想一想皮肤的湿疹·斑疹·瘙痒」的网页
<http://www.hifunokoto.jp>


甾体外用剂的自我正确使用方法

- 通常 1 日 2 次，症状严重时 1 日 3 次，适量* 涂于患部。
- 症状有好转时，请酌情减少用药次数。

※何谓适量？

用量标准——以指尖为单位

从软管中挤出相当于成人食指的指尖到第一关节的长度的量（约 0.5g），应涂抹至相当于两个手掌面积的皮肤上。按此标准，根据患部的面积决定用量。



涂展到成年人两个手掌大的面积上。

- ☑ 用药周期请不要超过一周。
- ☑ 使用 5-6 天后未见好转或恶化的场合，应考虑其他的病因或是病况超出了自我诊治的程度，请停药，并向医生、药师或持有销售许可证者咨询。
- ☑ 用药面积超过本人 2~3 个手掌的面积时，应考虑其超出了自我诊治的范围，使用前，请向医生、药师或持有销售许可证者咨询。
(给婴儿涂抹时，涂抹到 2~3 个婴儿手掌大的面积上)