

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。

下划线处：2017年2月修改

FLUCORT f 软膏

第2类医药品 湿疹、皮炎治疗药。 合成副肾上腺皮质激素· 抗生素复合制剂 外用软膏

本品为皮肤病治疗药，切勿用作化妆品以及剃须后的护肤品进行使用。大量或长期使用于颜面及口周围可能出现粉刺、疙瘩、颜面红肿、鳞状皮肤、多毛等症状，因此颜面部疾患应慎用。症状改善后请适时停药。

使用注意事项

禁止事项

【违反时则症状加重或易出现副作用】

1. 下列患者请禁用
 - 1) 使用本品曾出现过敏症状者。
 - 2) 对抗生素或副肾上腺皮质激素有过敏史者。
2. 下列部位请禁用
 - 1) 患有水痘、脚气、癣的部位。
 - 2) 浸润、溃烂严重的部位。
 - 3) 眼及眼睛周围。
3. 请不要在颜面部大面积使用。
4. 请不要当作化妆品以及剃须后的护肤品使用。
5. 请不要长期连续使用。



慎用事项

1. 下列患者请向医生、药师或持有销售许可证者咨询后使用。
 - 1) 正在接受医生治疗的患者。
 - 2) 患者本人或家族属过敏体质者。
 - 3) 有药物过敏史的患者。
 - 4) 颜面、口唇等粘膜部位用药的患者。
 - 5) 患处面积大的患者。
 - 6) 有深度创伤和严重烧伤的患者。
 - 7) 孕妇或有可能怀孕的患者。
 - 8) 高龄患者。
2. 使用后出现下列症状时，有可能是副作用，请立即停药，并持此说明书向医生、药师或持有销售许可证者咨询。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒、溃烂
皮肤（患处）	脚气、癣、粉刺、化脓、持续刺激感、变白

3. 用药5~6日后症状未见好转时，请停药，并持此说明书向医生、药师或持有销售许可证者咨询。

功用

适用于

- ◎伴有化脓的下列疾患：湿疹、皮炎、疖子、斑疹、冻疮、蚊虫叮咬、荨麻疹。
- ◎化脓性皮肤病（水泡疹、面疔、毛囊炎）。

用法用量

1日1~数次，请适量涂于患部。

<用法用量相关的注意事项>

- 1) 请严格按用法用量使用。
- 2) 用于儿童时，请在监护人的指导下使用。
- 3) 在与尿布接触的部位使用时，请不要把尿布包裹太紧，也请不要穿有塑料膜的密封性的短裤。
- 4) 请避免接触乳胶制品。
- 5) 请注意不要弄入眼睛。如果不慎弄入眼内，请立即用自来水或温水冲洗。严重时请去眼科就诊。
- 6) 本品仅供外用。

成分（1g中）

成分	含量
醋酸肤轻松（合成副肾上腺皮质激素）	0.25 mg
硫酸新霉素（抗生素）	3.5 mg（效价）

辅料：尼泊金、月桂酸聚乙二醇、丙二醇、纯蜂蜡、凡士林等。

保管及使用的注意事项

- 1) 请避免日光直射，阴凉干燥处密封保存。
- 2) 请在儿童接触不到的场所保存。
- 3) 请不要更换容器。（容易导致误用和变质）
- 4) 请不要使用过期的制品。



FLUCORT f 软膏

第2类医药品 湿疹、皮炎治疗药。 合成副肾上腺皮质激素· 抗生素复合制剂 外用软膏


准确理解， 正确治疗。

f

皮肤上
看 f 的
力量

湿疹、皮炎等皮肤疾患，通常表现为炎症引起的皮肤红、肿、痒等症状。瘙痒严重时，常常因难以忍受而不由自主地抓挠。抓挠本身又会形成刺激，使炎症加重、瘙痒加剧，从而陷入一个恶性循环。而一旦挠破患处，不仅延长治疗周期，而且治愈后有时会留下疤痕。抓破的伤口适宜细菌繁殖，容易引起化脓。因此发现皮肤疾患后，迅速采取有效的治疗措施是非常重要的。

配合具有极好抗炎症作用的外用甾体·肤轻松 —



关于甾体外用剂（合成副肾上腺皮质激素复合外用剂）

■ 何谓甾体外用剂？

副肾上腺皮质激素是体内激素的一种，具有抑制炎症的作用。化学结构经优化、抗作用经强化后的副肾上腺皮质激素视为合成副肾上腺皮质激素。用于外皮的合成副肾上腺皮质激素，称为外用甾体，作成外用制剂后，称其为甾体外用剂。甾体外用剂不仅能抑制红、肿、痒等症状，还有抑制炎症发生的作用。

■ 关于药效的强度

包括处方医药品在内，外用甾体的药效强度分为5级，其中OTC（非处方）医药品有弱、中弱、强3个等级，醋酸肤轻松属于强效的一类。



■ 关于副作用

合成副肾上腺皮质激素作为内服药被用于多种炎症，但其有抑制肾上腺机能等全身性的副作用。因此，开发了对于全身影响比较小的甾体外用剂。作为甾体外用剂，其副作用主要是长期使用后有皮肤变薄、皮肤血管扩张的现象。另外，用于因脚气等引起的感染部位时，可能会使症状恶化。使用前请仔细阅读软膏管背面的使用注意事项，并正确地使用。

为正确认识和治理皮肤疾患，本公司开设了题为「想一想皮肤的湿疹·斑疹·瘙痒」的网页
<http://www.hifunokoto.jp>

甾体外用剂的自我正确使用方法

通常1日2次，症状严重时1日3次，适量*涂于患部。症状有好转时，请酌情减少用药次数。

※何谓适量？

用量标准——以指尖为单位

从软管中挤出相当于成人食指的指尖到第一指关节的长度的量（约0.5g），应涂抹至相当于两个手掌面积的皮肤上。按此标准，根据患部的面积决定用量。



涂展到成年人两个手掌大的面积上。

- ✓ 用药周期请不要超过一周。
- ✓ 使用5-6天后未见好转或恶化的场合，应考虑其他的病因或是病况超出了自我诊治的程度，请停药，并向医生、药师或持有销售许可证者咨询
- ✓ 用药范围超过本人2~3个手掌的面积时，应考虑其超出了自我诊治的范围，使用前，请向医生、药师或持有销售许可证者咨询。