

이 문서는 제품에 대한 참조 정보입니다. 제품에 첨부 된 문서를 꼭 확인 하시기 바랍니다.

일출 부분 : 2017년 2월 개정

후루코트 f 연고

제2류 의약품 습진,피부염 치료약 합성 부신피질 호르몬,항생물질 배합 외피용 연고제

본 약제는 피부질환 치료약이므로 화장용이나 면도질 후에는 사용하지 마십시오. 대량 또는 장기간 사용하면 얼굴과 입 주변에 여드름 혹은 부스럼이 생기며 얼굴의 피부가 벗겨지거나 부어오를 경우가 있으며, 피부가 거친 살갓처럼 되거나 다모증이 생기는 일이 있으므로, 특히 얼굴에 사용할 때에는 주의하여 주십시오. 또한 증상이 개선된 후에는 만연하게 연용하지 마십시오.

⚠ 사용상의 주의 사항

⊗ 금지해야 할 사항

【이 금지 사항을 준수하지 않으면, 증상이 악화되거나 부작용이 일어날 수 있습니다】

- 아래의 경우에는 사용하지 마십시오.
 - 본 약제로 인한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 항생물질 또는 부신피질 호르몬에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
- 아래의 부위에는 사용하지 마십시오.
 - 수두, 무좀, 백선 등이 있는 환부.
 - 습하고 진무르기가 심한 환부.
 - 눈, 눈 주위.
- 얼굴의 넓은 범위에는 사용하지 마십시오.
- 화장용이나 면도질 후에는 사용하지 마십시오.
- 장기간 연용하지 마십시오.



■ 상담해야 할 경우

- 아래의 경우에는 사용 전에 의사, 약제사 또는 등록판매자와 상담하여 주십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 경우.
 - 약제 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 경우.
 - 얼굴, 입술 등의 점막에 사용하려는 경우.
 - 환부가 넓은 범위인 경우.
 - 깊은 상처나 심한 화상이 있는 경우.
 - 임신부 또는 임신 가능성이 있는 사람.
 - 고령자.
- 사용후, 이하의 증상이 나타났을 경우, 부작용일 가능성이 있으므로, 즉시 사용을 멈추고, 이 첨부 설명서를 가지고 의사, 약제사 또는 등록판매자와 상담하여 주십시오.

부 위	증 상
피 부	발진, 홍점, 가려움, 여드름
피 부(환부)	무좀, 백선, 여드름, 화농증상, 지속적인 자극감, 하얗게 변함

- 5~6일 동안 사용한 후에도 증상이 나아지지 않을 경우, 사용을 멈추고, 이 첨부 설명서를 가지고 의사, 약제사 또는 등록판매자와 상담하여 주십시오.

효능 ◎화농을 동반한, 다음의 여러 증상:습진, 피부염, 딱피, 부드럼, 동상, 벌레물림, 두드림
 ◎화농성 피부질환 (홍점, 농피증, 모낭염)

용법,용량 하루 1회~수회, 적량을 환부에 도포하십시오

<용법·용량에 관한 주의 사항>

- 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 소아에 사용할 경우에는, 보호자의 지도 감독 밑에 사용해 주십시오.
- 기저귀를 치는 부위에 사용할 경우에는 너무 작은 기저귀나 비닐제 등 밀봉성 팬츠는 사용하지 마십시오.
- 라텍스 고무 제품과 접촉시키지 마십시오.
- 눈에 들어가지 않도록 주의해 주십시오. 만일 눈에 들어갔을 경우에는 곧 물 또는 미지근한 온수로 씻으십시오. 증상이 심할 경우에는 안과 의사의 진료를 받으십시오.
- 이 약제는 외용으로만 사용해 주십시오.

성분 (1g 중)

성 분	합 량
플루오시놀론아세토니드 (합성 부신피질 호르몬)	0.25mg
후라지오마이신 황산염 (항생물질)	3.5mg (력가)

첨가물:과라벤, 라우린산폴리에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 밀랍, 바셀린

보관 및 취급상의 주의 사항

- 직사일광이 닿지 않는, 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관해 주십시오.
- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 다른 용기에 갈아 넣지 마십시오. (오용될 우려가 있으며, 품질이 변할 수 있습니다)
- 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



제조 판매 회사



다나베 미츠비시 제약 주식 회사

오사카시 류오구 도쇼마치 3-2-10


제2류 의약품 습진, 피부염 치료약 합성 부신피질 호르몬, 항생물질 배합 외피용 연고제

정확히 알고, 올바르게 치료

습진·피부염 등의 피부 트러블은 피부에 염증이 일어나고, 벌개짐, 부어오름, 가려움 등의 증상으로 나타납니다. 가려운 증상이 심할 때에는 참지 못해서 긁어 버릴 수 있으며, 이것이 자극이 되어 염증이 더욱 심해지고 더더욱 가려워지는 악순환이 일어납니다. 긁어서 환부가 손상되면 치료 기간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 치료후에도 자국이 남게 됩니다. 손상된 환부는 세균이 증식하여 화농하기 쉬운 상태로 됩니다. 피부 트러블이 생기면, 곧 유효한 치료를 하는 것이 중요합니다.



뛰어난 항염증 작용이 있는 외용 스테로이드제인 플루오시놀론아세토니도를 배합




하여

■ 스테로이드 약제이란?

체내에서 생성되는 호르몬의 하나인 부신피질 호르몬은 신체 내에서 일어나는 염증을 억제하는 작용이 있습니다. 이 부신피질 호르몬의 구조를 개량하여, 항염증작용을 증강시킨 것이 합성 부신피질 호르몬 약제입니다. 이 중에서 외피용으로 사용되는 성분을 외용 스테로이드제라고 하며, 벌개짐, 부어오름, 가려움 등의 증상을 억제할 뿐만 아니라, 염증의 발생을 억제하는 작용도 있습니다.

■ 약효의 랭크에 대하여

외용 스테로이드제의 약효 강도는 의료용 의약품을 포함하여 5 단계로 분류되어 있습니다. OTC 의약품은 '약', '중간', '강'의 3 단계로 분류되어 판매되고 있으며, 플루오시놀론아세토니도는 '강'으로 분류되어 있습니다.



■ 부작용에 대하여

합성 부신피질 호르몬은 많은 염증성 질환 치료에 내복용으로 사용되어 왔지만, 부신 기능에 대한 억제 등, 전신성 부작용이 가끔 문제로 되어 왔습니다. 전신에 대한 영향을 줄일 수 있도록 개발된 것이 스테로이드 외용제입니다. 이 스테로이드 외용제의 부작용으로서는, 장기적으로 연용했을 경우, 피부가 민감해지고 피부 혈관이 확장되는 증상이 나타나는 일이 있습니다. 또한 무좀 등의 감염이 있는 부위에 도포할 때에는 증상이 악화될 수도 있습니다.

뒷면에 써어 있는 사용상의 주의 사항을 잘 읽어 보시고 올바르게 사용하여 주십시오.


저희 회사에서는 피부 트러블을 정확히 알고 올바르게 치료하기 위하여 [습진, 진물림, 가려움을 무찌르는 히후노코토사이트]를 개설하고 있습니다.
<http://www.hifunokoto.jp>

스테로이드제의 정확한 사용방법

- 환부에 적량을 보통 하루 2 회, 증상이 심할 때에는 하루 3 회 정도 도포하십시오.
- 증상이 나아지면 회수를 줄이면서 사용해 주십시오.

※적량이란?

사용량의 척도 「집게 손가락 척도」
어른의 집게 손가락 끝에서 첫 번째 관절까지의 길이 정도의 양(약 0.5g)을 튜브에서 짜낸 경우, 어른의 손바닥 두 개 정도의 면적에 도포하면 됩니다. 이 양을 척도로 환부 면적에 맞는 적절한 사용량을 정하여 주십시오.



어른의 손바닥 두개 정도의 면적에 도포하십시오.

- ✓ 일, 주일, 이차은 사용하지 말아 주십시오.
- ✓ 5-6 일 동안 사용하고 개선되지 않거나 악화되는 경우는, 다른 원인일 수 있거나 자가 치료의 범위를 넘어 있다고 생각할 수 있으므로, 사용을 중지하고, 의사, 약제사 또는 등록판매자와 상담하여 주십시오.
- ✓ 환부가 사용하는 사람 손바닥의 2-3 배를 넘을 정도로 심할 때에는, 자가 치료의 범위를 넘어 있다고 생각할 수 있으므로, 사용을 중지하고, 의사, 약제사 또는 등록판매자와 상담하여 주십시오.