

이 문서는 제품에 대한 참조 정보입니다. 제품에 첨부된 문서를 꼭 확인하시기 바랍니다.

제 3 류의약품

일본약국방 우르소데옥시콜산 정

다나베위장약 우르소

소화기용약

앞으로도 맛 있게 먹을 수 있도록 소화기 멘테넨스

장-간 순환이기 때문에---

장에서 흡수된 우르소데옥시콜산(UDCA)은 간장과 담낭을 거친 후, 장 안에 배출되어 다시 장에서 흡수됩니다. 이 사이클을 [장-간 순환]이라고 하는데, UDCA 는 위장 뿐이 아니라 간장과 담낭에서도 오랜 시간에 걸쳐서 작용하게 됩니다. 그러므로 [1 일 1 회]의 복용으로 [소화기 멘테넨스]에 효과를 발휘합니다.

담즙산의 분비를 촉진하기 때문에---

0나이가 들어서 그런지, 기름진 요리를 먹으면 위에 불쾌감이 난다. 그 것은 지방 등의 소화흡수를 도와 주는 담즙산의 분비 저하가 원인의 하나입니다. UDCA는 담즙산의 분비를 촉진하여 줌으로써, 지방에 기인되는 [위트림과 소화불량]을 개선합니다.

사용상의 주의 사항



상의해야 합니다

- 다음 분은 복용 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 상의하여 주십시오.
 - (1) 의사의 치료를 받아 계시는 분.
 - (2) 임부나 임신하고 있을 가능성이 있는 분.
 - (3) 약제 등에 의하여 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 분.
- 복용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용일 수 있기 때문에, 즉시 복용을 중단하여, 이 첨부문서를 가지고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 상의하여 주십시오.

관계부위	증상
피부	발진-발적, 가려움
소화기	설사, 구토감

- 2 주일 정도 복용을 계속하여도 증상이 개선되지 않는 경우에는 복용을 중단하여, 이 첨부문서를 가지고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 상의하여 주십시오.

효능

위트림, 소화불량, 소화불량에 인한 위부-복부 팽만감, 식욕부진(식욕감퇴), 소화촉진, 과식, 가슴 막힘

용법,용량

1일 1회 1정을 저녁 식전 또는 저녁 식후에 복용하여 주십시오.


연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	1정	1일 1회
15세 미만	복용하지 마십시오.	

<용법-용량에 관련되는 주의>

(1) 용법-용량을 엄수하여 주십시오.

(2) 정제를 꺼내는 방법

오른 쪽 그림과 같이, 정제가 들어 있는 PTP 시트의 윗면을 손가락으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 박을 찢어서 1정을 꺼내어서 복용하여 주십시오. (잘 못하여 그냥 복용하면, 점막이 찢리는 등 사고가 일어날 수도 있습니다.)



성분(1 일량:1 정당)

우르소데옥시콜산 50mg

첨가물:히드록시프로필셀룰로오스, 스테아린산 마그네슘, 셀룰로오스, 옥수수 전분, 카멜로스 칼슘, 경질무수규산

보관 및 취급상의 주의사항


(1) 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 선선한 장소에 보관하여 주십시오.

(2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

(3) 다른 용기에 갈아 넣지 마십시오.

값요용될 우려가 있으며, 품질이 변할 수 있습니다

(4) 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



제조 판매 회사
다나베 미즈비시 제약 주식 회사
오사카시 츄오구 도쇼우마치 3-2-10
홈페이지 www.mt-pharma.co.jp