

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# メディピュア<sup>®</sup>ST

## ステロイド軟膏

販売名：メディピュアST

第2類医薬品

湿疹・皮膚炎の治療薬 合成副腎皮質ホルモン配合 外皮用薬

湿疹・皮膚炎は異物の刺激やアレルギー反応などによって皮膚が炎症を起こし、多くの場合、患部が赤くはれ、ブツブツができ、かゆみを伴います。メディピュアSTは、主成分プレドニゾロン(合成副腎皮質ホルモン)とグリチルレチン酸(抗炎症成分)が作用して、湿疹・皮膚炎などの炎症を抑えます。デリケートエリアの薄くて薬剤の浸透しやすい皮膚にもお使いいただける無着色、無香料、防腐剤フリーの軟膏タイプの外用剤です。

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。  
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 患部が広範囲の人。
  - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位   | 症 状                               |
|--------|-----------------------------------|
| 皮膚     | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感     |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**効 能** かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、虫さされ、あせも、じんましん、しもやけ

**用法・用量** 1日1～4回、適量を患部に塗布してください。

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

#### 成分(1g中)

| 成 分                 | 含 量   | は た ら き       |
|---------------------|-------|---------------|
| プレドニゾロン(合成副腎皮質ホルモン) | 2.5mg | 皮膚の炎症・はれを抑えます |
| グリチルレチン酸            | 5mg   | 皮膚の炎症・はれを抑えます |

添加物:ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、パラフィン、ワセリン

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



販売元  
**田辺三菱製薬株式会社**  
大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元  
**TEIKA 株式会社**  
富山市荒川一丁目3番27号

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は下記にお願いいたします。  
田辺三菱製薬「くすり相談センター」  
(フリーダイヤル 0120-54-7080)  
受付時間:弊社営業日の9:00～17:30